

DENTALON® plus

- DE** Gebrauchsanweisung
- GB** Instructions for use
- FR** Mode d'emploi
- ES** Instrucciones de uso
- IT** Istruzioni per l'uso
- PT** Instruções de uso
- NL** Gebruiksaanwijzing
- SE** Bruksanvisning
- DK** Brugervejledning
- NO** Bruksanvisning
- FI** Käyttöohjeet
- GR** Οδηγίες χρήσεως
- TR** Kullanma talimatı
- RU** Инструкция по применению

CE 0197

Manufacturer:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)

Made in Romania

Distributed in USA /
Canada exclusively by:
Kulzer, LLC
4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614-2517
1-800-431-1785

Caution: Federal law restricts this device
to sale by or on the order of a dentist.

Importado e Distribuído por
Kulzer South América Ltda.
CNPJ 48.708.010/0001-02
Rue Cenno Sbrighi, 27 - cj. 42
São Paulo - SP - CEP 05036-010
sac@kulzer-dental.com

Resp. Técnica: Dra. Regiane Marton -
CRO 70.705
Nº ANVISA: vide embalagem

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

60505132/12

DENTALON® plus

Résine autopolymérisable pour les couronnes et les bridges provisoires, combinaison poudre et liquide utilisation réservée au dentiste.

Couleurs	Code de couleurs*	Code de couleurs Bident
L (light)	A3	17
M (medium)	A 3, C 3	23
D (dark)	A 3,5, A 4, B 3, B 4	41

Composition

La poudre contient:

- polyéthyléméthacrylate/acrylate de polyméthyle

Le liquide contient:

- n-butylmethylacrylate/acrylate d'uréthane/ méthacrylate d'éthyle

Domaines d'application

Réalisations directes de couronnes et de bridges provisoires, réalisations de couronnes provisoires avec coiffes dentaires.

Mode d'emploi

• La poudre et le liquide sont mélangés dans une proportion de 2 g pour 1,2 à 1,5 ml. La quantité est fonction du besoin.

• Verser le liquide dans le godet de mélange. Le dosage du liquide peut s'effectuer par le goutte à goutte intégré et aussi par la pipette jointe. Dans le cas de l'utilisation de la pipette, le goutte à goutte doit être enlevé. Verser la poudre et mélanger 40 s à l'aide d'une spatule de verre jusqu'à obtention d'une bonne homogénéité. La résine est fluide pendant 40 s. La phase plastique qui dure 5 min commence au bout de 2 min. Au bout de 9,5 min, Dentalon® plus est durci. On peut alors effectuer le finissage et le polissage.

Phase de mélange	Phase liquide (1 min env.)	Phase plastique (5 min env.)	Polymerisation (2,5 min)
	40 s	2 min	7 min

Les temps indiqués peuvent varier en fonction des changements de la température ambiante.

Mise en œuvre

• Couronnes et bridges provisoires Avant d'effectuer la préparation, réaliser une empreinte de situation avec de l'alginate ou du silicone. Conserver l'empreinte jusqu'à l'achèvement de la préparation (conserver le modèle d'alginate en milieu humide). Préparer les dents, puis isoler les moignons avec une mince couche de vaseline ou de graisse de silicone. Mélanger Dentalon® plus et verser le dans l'empreinte lorsqu'il se trouve en phase liquide. Pour les bridges provisoires, enlever assez de substance pour empreinte entre les dents d'ancrage pour permettre la réalisation d'un bridge fonctionnant bien. Dès obtention d'une bonne consistance plastique,

Mode d'emploi (FR)

placer l'empreinte en bouche. Pendant la phase de durcissement, on peut enlever l'empreinte et éliminer les débordements.

• Après la préparation, sélectionner la coiffe dentaire et la découper sur la face cervicale. Ensuite isoler le moignon de dent avec une mince couche de vaseline ou de graisse de silicone. Mélanger Dentalon® plus. Remplir la coiffe dentaire pendant la phase liquide du produit et la mettre en place pendant la phase plastique. Enlever la couronne du moignon pendant la phase de polymérisation et réaliser le durcissement définitif.

• Effectuer le finissage de Dentalon® plus avec des diamants gros et moyens et des fraises à dents étiquées. Polir sans pression avec des produits à polir à base de silicone. Pour obtenir le poli à reflet, polir avec un disque de laine et un produit à polir à base de silicone.

• Les couronnes et bridges provisoires sont fixés avec des ciments provisoires. Mis en garde

• L'emploi de Dentalon® plus est contre-indiqué en cas d'allergie prouvée aux composants du système.

• Des effets secondaires généraux ne sont pas connus. Dans certains cas, des réactions allergiques de type IV sont décrites.

• Des décolorations peuvent survenir en cas de contact avec des colutaires caténiques, avec des dévitalisateurs de plaque et avec de la chlorhexidine.

• Ne pas utiliser le produit au-delà de la date limite de conservation. Ne pas stocker à plus de 25°C (77°F), éviter le rayonnement solaire direct. Refermer toujours le flacon après utilisation. Conserver le produit hors de portée des enfants.

• Irritant, ce produit contient du méthacrylate d'éthyle, diacrylate d'uréthane, méthacrylate de butyle. Inflammable. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Évitez le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés.

• Unités de livraison Assortiment 6 x 20 g poudre couleurs L, M, D 45 ml liquide Emballages simples couleurs L, M, D liquide • Marque déposée par Vita-Zahnfabrik, Bad Säckingen

Mise à jour de l'information: 2013-09

plastique. Durante a fase de polimerização a matriz deve ser removida. Esperar a polimerização total antes de iniciar o acabamento e polimento.

• O acabamento e polimento são realizados com o auxílio das pontas diamantadas de granulação grossa, média e fina, e brocas multilâminadas. O pré-polimento pode ser realizado com pastas convencionais para polimento, sob leve pressão.

• A cimentação deve ser realizada com cimento provisório.

• Recomendações especiais

• Dentalon® plus não deve ser utilizado em casos de alergia comprovada aos componentes do sistema.

• Não se tem registros de efeitos colaterais sistêmicos. Em casos isolados, foi constatado casos de alergia do tipo IV.

• Em contato com colutórios caténicos, removedores de placas e clorexidina pode ocorrer descoloração.

• Não utilizar o produto com data de validade vencida. Não armazenar à temperatura superior 25°C (77°F) e evitar a exposição direta à luz solar. Fechar a embalagem após cada uso e armazenar fora do alcance das crianças.

• Provoca irritações; produto contém etilmecrilato, metanodiacrilato, butilmecrilato. Inflamável. Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Manter afastado do chama ou fumaça - Não fumar. Evitar o contacto com a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista. Usar luvas adequadas.

Instruções de uso (PT)

plástica. Durante a fase de polimerização a matriz deve ser removida. Esperar a polimerização total antes de iniciar o acabamento e polimento.

• O acabamento e polimento são realizados com o auxílio das pontas diamantadas de granulação grossa, média e fina, e brocas multilâminadas. O pré-polimento pode ser realizado com pastas convencionais para polimento, sob leve pressão.

• A cimentação deve ser realizada com cimento provisório.

• Recomendações especiais

• Dentalon® plus não deve ser utilizado em casos de alergia comprovada aos componentes do sistema.

• Não se tem registros de efeitos colaterais sistêmicos. Em casos isolados, foi constatado casos de alergia do tipo IV.

• Em contato com colutórios caténicos, removedores de placas e clorexidina pode ocorrer descoloração.

• Não utilizar o produto com data de validade vencida. Não armazenar à temperatura superior 25°C (77°F) e evitar a exposição direta à luz solar. Fechar a embalagem após cada uso e armazenar fora do alcance das crianças.

• Provoca irritações; produto contém etilmecrilato, metanodiacrilato, butilmecrilato. Inflamável. Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Manter afastado do chama ou fumaça - Não fumar. Evitar o contacto com a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista. Usar luvas adequadas.

OBS.: As variações de temperatura do local de trabalho podem causar alterações nos tempos indicados.

Técnica de trabalho

• Coroas e próteses parciais provisórias

Antes do preparo, moldar a região com alginate ou silicone. Conservar o molde até que o preparo seja concluído (conservar o molde de alginate úmido). Preparar os dentes e isolar os núcleos com uma fina camada de vaselina isolante para silicone. Misturar o Dentalon® plus e colocar no molde durante a sua fase líquida. Quando o Dentalon® plus estiver apresentando uma consistência plástica, introduzir o molde na boca. Mediante este reposicionamento é confeccionado um elemento provisório. Durante a fase de polimerização pode-se remover o molde e eliminar os excessos de resina.

• Após o preparo do dente, selecionar a matriz pré-fabricada e recortar na cervical. Em seguida isolar a coroa com uma fina camada de vaselina. Misture o Dentalon® plus e preencha a matriz com a fase líquida, e insira o material durante a fase

DENTALON® plus

Selbsthärtender Kunststoff für provisorische Kronen und Brücken, Kombination Pulver und Flüssigkeit zur Anwendung durch den Zahnarzt.

Farbe	Farbschlüssel*	Farbschlüssel Bident
L (light)	A3	17
M (medium)	A 3, C 3	23
D (dark)	A 3,5, A 4, B 3, B 4	41

Zusammensetzung

Pulver enthält:

- Polyethylmethacrylat/Polymethacrylat

- anorganische Füllstoffe

Flüssigkeit enthält:

- n-Butylmethacrylat/Urethanacrylat/ Ethylmethacrylat

Anwendungsgebiete

Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken im direkten Verfahren, provisorische Kronen mittels Konfektionskronenformen.

Art der Anwendung

• Pulver und Flüssigkeit werden im Verhältnis 2 g:1,2 bis 1,5 ml gemischt.

• Flüssigkeit im Amnischbecher vorlegen. Die Dosierung der Flüssigkeit kann über den integrierten Tropfer oder mit der beigelegten Pipette erfolgen. Bei Verwendung der Glaspipette muß der Tropfer entfernt werden. Pulver einstreuen und 40 s lang homogen mit Glasspatel mischen. Der Kunststoff ist danach 40 s geöffnigt. Die plastische Phase beginnt nach 2 min und bleibt ca. 5 min erhalten. Dentalon® plus ist nach 9,5 min ausgehärtet und kann anschließend ausgearbeitet werden.

Amnischphase	Gießphase (ca. 1 min)	plastische Phase (ca. 5 min)	Polymerisation (2,5 min)
	40 s	2 min	7 min 9,5 min

Die angegebenen Zeiten können durch Schwankung der Umgebungstemperatur beeinflußt werden.

Verarbeitung

• Provisorische Kronen und Brücken Situationsabformung vor der Präparation mit Alginate oder Silikon durchführen. Die Abformung bis zum Schluß der Präparation aufbewahren (Alginateabdruck feucht lagern). Zahne präparieren, danach Stümpe mit Vaselin oder Silikonfett dünn isolieren. Dentalon® plus ammischen und während der Gießphase einbringen. Bei Brückenprovisorien soviel Abformmaterial zwischen den Pfeilerzähnen entfernen, daß ein funktionsfähiges Brückenglied gestaltet werden kann. Sobald eine gute plastische Konsistenz erreicht ist, die Abformung in den Mund einbringen. Während der Aushärtungsphase kann die Abformung entfernt und Kunststoffüberschüsse beseitigt werden.

• Reizend: Produkt enthält Ethylmethacrylat, Urethanacrylat, Butylmethacrylat. Entzündlich. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Lieferinheiten

Sortiment

6x20 g Pulver

Farben L, M, D

45 ml Flüssigkeit

Einzelpackungen

Farben L, M, D

Flüssigkeit

Eingetragenes Warenzeichen der Vita-Zahnfabrik, Bad Säckingen

Stand: 20

DENTALON® plus

Brugervejledning DK

Selvberedende resinbaseret materiale til provisoriske kroner og broer, kombination pulver og væske. Til anvendelse af tandlæger.

Farve	Farvekode*	Farvekode Bident
L (light)	A3	17
M (medium)	A 3, C 3	23
D (dark)	A 3,5, A 4, B 3, B 4	41

Sammensætning

Pulveret indeholder:
– Polyethylmethacrylat/Polymetakrylat

Væsken indeholder:
– n-Butylmethacrylat/Uretanakrylat/
Ätymetakrylat

Anvendelsesområder

Fremstilling til provisoriske kroner og broer med den direkte metode, provisoriske kroner ved hjælp af konfektionskroneform.

Anvendelsesmetoder

• Pulveret og væsken blandes i forholdet 2 g: 1,2 til 1,5 ml. Mængden rettes sig efter behovet.

• Væsken lægges frem i sammenblandsbeholderen. Doseringen af væsken kan foretages over den integrerede dræbeindretning eller med den vedlagte pipette. Ved anvendelse af glaspipetten skal dræbeindretningen fjernes. Pulveret drysses i og blandes homogen i 40 sek. med glaspallen. Kunstoffet kan deretter hældes i 40 sek. Den plastiske fase begynder efter 2 min. og holder i ca. 5 min. Dentalon® plus er gennemhærdet efter 9,5 min. og kan deretter færdigbehandles og poleres.

Sammensætning	Støbefase	Plastisk faze (ca. 1 min)	Polymerisation (ca. 5 min)
	40 sek	2 min	7 min 9,5 min

De angivne tider kan påvirkes af svingninger i omgivelserstemperaturer.

Forarbejdning

• Provvisoriske kroner og broer
Lav primærtrykket, inden præparationen med alginat eller silikon. Aftrykket skal opbevares til præparationens afslutning (alginattryk opbevares fugtigt). Præparer tænderne og isoler derefter stubben med et tyndt lag vaseline eller silikonfedtstof.

Dentalon® plus blandes og kommer i aftrykket i løbet af støbefasen. Ved provisoriske broer fjernes så meget aftryksmaterialerne mellem sojletænderne, at der kan laves et funktionstydigt broelement. Så snart en god plastisk konsistens er nået, indsættes aftrykket i munden. I løbet af gennemhærdningsfasen kan aftrykket fjernes og overskydende materiale fjernes.

• Efter præparationen udvalges den konfektionerede tandkappe og skæres til cervikalt. Derpå isoleres stødbunden med et tyndt lag vaseline hhv. silikonfedtstof. Bland Dentalon® plus. Fyld kronekappen i løbet af støbefasen, indsæt materialet i løbet af den

DENTALON® plus

Bruksanvisning NO

Selvberedende kunststof til provisoriske kroner og broer, kombinasjon pulver og væske til bruk av tannlegeen.

Farge	Fargenøkkel*	Fargenøkkel Bident
L (light)	A3	17
M (medium)	A 3, C 3	23
D (dark)	A 3,5, A 4, B 3, B 4	41

Sammensætning

Pulveret inneholder:
– polyethylmetakrylat/polymetakrylat
– anorgansktifflingsmaterial

Væsken inneholder:
– n-butylmethacrylat/uretanakrylat/
ätymetakrylat

Indikasjon

Benyttet til provisoriske kroner og broer ved en direkte fremgangsmetode, provisoriske kroner ved hjelp av konfeksjonskroneavtrykk.

Bruk

• Pulver og væske blandes i forholdet 2 g: 1,2 til 1,5 ml. Mengden rettes sig etter behovet.

• Kan fremkalde irritationer; produktet inneholder etylenmetakrylat, uretandiakrylat, butylmetakrylat. Brandfarlig. Irriterer øjene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Den plastiske fasen begynder efter 2 min. og holder i ca. 5 min. Dentalon® plus er gennemhærtet efter 9,5 min. og kan deretter færdigbehandles og poleres.

Leveringsenheder

Sortiment

6 x 20 g pulver farver L, M, D

45 ml net væske

40 sek 2 min 7 min 9,5 min

De angivne tider kan påvirkes af svingninger i omgivelserstemperaturer.

Bearbejdning

• Provvisoriske kroner og broer
Lav primærtrykket, inden præparationen med alginat eller silikon. Aftrykket skal opbevares til præparationens afslutning (alginattryk opbevares fugtigt). Præparer tænderne og isoler derefter stubben med et tyndt lag vaseline eller silikonfedtstof.

Dentalon® plus blandes og kommer i aftrykket i løbet af støbefasen. Ved provisoriske broer fjernes så meget aftryksmaterialerne mellem sojletænderne, at der kan laves et funktionstydigt broelement. Så snart en god plastisk konsistens er nået, indsættes aftrykket i munden. I løbet af gennemhærdningsfasen kan aftrykket fjernes og overskydende materiale fjernes.

• Efter præparationen udvalges den konfektionerede tandkappe og skæres til cervikalt. Derpå isoleres stødbunden med et tyndt lag vaseline hhv. silikonfedtstof. Bland Dentalon® plus. Fyld kronekappen i løbet af den

* Registreret varemærke for Vita-Zahnfabrik, Bad Säckingen

Ajourfort: 2013-09

DENTALON® plus

Bruksanvisning NO

sen trekkes kronen av tannkonusen og uthedes ferdig.

• Dentalon® plus skal bearbeides med grove, mellemfrie diamanter og fræsere. Materialer behandles med silikonpolerer og højglaspoleres med bomuldspolerer og polerplaster.

• Krone- og bro-provisorier befæstiges med gængs provisorisk cement.

Spesielle henvisninger

• Dentalon® plus skal ikke anvendes ved påviste allergier mod systemets bestanddele.

• Systemiske bivirkninger er ikke kendt. I enkelte tilfælle er det mulig for allergiske reaktioner af typen IV.

• Ved berorung med kationsk munnevann samt plakkrelevaratorer og klorhexidin kan det opstå fargeforandringer.

• Skal ikke overbevares over 25°C (77°F). Direkte solstråler må unngås. Etter utgått holdbarhedsdato skal materialet ikke benyttes lenger. Beholderen skal lukkes efter bruk og oppbevares utgjengelig for barn.

• Irriterer, produktet inneholder etylenmetakrylat, uretandiakrylat, butylmetakrylat, antenneliggende, irritanter øyne, pustearer og hud. Sensibilisering ved hudkontakt er mulig. Holdes borte fra tenningskilder – roking forbudt. Berorung med hud skal unngås. Ved øyekontakt skylles straks med vann og lege konsulteres. Egnete vernehansker skal benyttes.

Leveringsenhenter

Sortiment

6 x 20 g net pulver

fargene L,M,D

45 ml net væske

40 s 2 min 7 min 9,5 min

De angitte tiden kan forandre seg noe i forhold til omgivelserstemperaturen.

Bearbejdning

• Provvisoriske kroner og broer
Aftrykket gjøres for preparering med elginat eller silikon. Aftrykket oppbevares intill avsluttet preparering (elginattrykket lagres fuktig). Tennen prepareres, derefter isoleres konusene med et tynt lag vaselin eller silikonfett. Dentalon® plus blandes sammen og fylles i løpet av hellefaseen i aftrykket. Angående bivirkninger skal så mye avtryksmaterial mellom tennene fjernes slik at det kan lages et funksjonelt broledd. Straks den plastiske konsistensen er riktig, skal aftrykket legges inn i munnen. Under uthedningsfasen kan aftrykket tas ut og overflodig kunststof fjernes.

• Etter prepareringen velges ut en konfeksjonskronekappe som skjæres til cervikalt. Deretter isoleres tannkonusen med vaselin hhv. silikonfett i et tynt lag. Dentalon® plus blandes sammen. Hell i kronekappen under hellefaseen, materialet settes inn under den plastiske fasen. Under polymerisasjonsfa-

* Registrert varemærke fra Vita-Zahnfabrik, Bad Säckingen

Redaksjonen avsluttet: 2013-09

DENTALON® plus

Käyttöohje FI

Itsekotuvaa muovi väliaikaisiin kruunuihin ja siltoihin, jauheen ja nesteen yhdystelma. Hammasläääkärin käytöön.

• Käsittelee Dentalon® plus karkeilla, keskihiekkillä timanttiporilla ja riistinrihaltaillulla porilla. Viimeistele materiaali silikonkilpittomilla materiaalilla painamatta ja korkeakillolla vilailailla ja tavalliseen kiloiltoon.

• Väliaikaisista kruunujen ja siltojen valmistamiseen suorailla menetelmällä, väliaikaisien kruunujen valmistamiseen valmis kruunujen avulla.

• Dentalon® plus -ainetta ei saisi käyttää, jos tiedetään potilaan olevan allerginen järjestelmän aineksille.

• Systemattisia sivuvaikutuksia ei ole tiedossa. Yksittäisissä tapauksissa on todettu allergisia reaktioita (typpi IV).

• Äineen joutossa kosketuksissa kationisten suuvesien sekä plakkirelevaratojen ja klorihieddin kanssa voi esiintyä välityömyiä.

• Materialiaa ei saa enää käyttää, kun viimeinen käytöipaikka on menettänyt umpeen. Ei saa säilyttää yli 25°C (77°F) lämpötiloissa. Ei saa altistaa suoralle auringonvalolle. Sulje pullot aina käytön jälkeen ja säilytä niitä lasten ulottumattomissa.

• Ärsyttää, tuo sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin. Sytytä Ärsyttää, tuo sisältää silmin, hengityselimää ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Erilistävä sytytyslähteestä – Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos anneta joutuu silmiin, huuhtolataa heti vedellä ja ottavaa yhteyttä lääkärin. Käytettävä aineita ilmoittaa lääkärin.

• Toimituskuva: tuote sisältää etylenmetakrylaatin, uretandiakryylit, butylmetakrylaatin